

子育て

前期ポリオ予防接種
集団接種を実施します

●対象児 生後3か月〜生後90か
月未満で、まだ2回投与を受け
ていないお子さん（望ましい接
種月令 生後3か月〜18か月）
●接種費用 無料
●期日・場所・対象地区

| 期日 | 場所 | 対象地区 |
|----------|-------------|-------------------------|
| 4月7日(水) | 大田原東地区公民館 | 加治屋・紫塚・若松町・末広・野崎全地区 |
| 4月8日(木) | 湯津上環境改善センター | 湯津上全地区 |
| 4月9日(金) | 大田原東地区公民館 | 浅香・富士見・住吉町・実取団地・親園全地区 |
| 4月14日(水) | 黒羽保健センター | 川西全地区・須賀川全地区 |
| 4月16日(金) | 大田原東地区公民館 | 美原・新富町・山の手・元町・城山・佐久山全地区 |
| 4月20日(火) | 黒羽保健センター | 黒羽全地区・両郷全地区 |
| 4月22日(木) | 大田原東地区公民館 | 若草・本町・中央・金田全地区 |

- 受付時間 午後1時20分〜2時20分（時間厳守）
- 持ち物 親子健康手帳または母子健康手帳・予防票（保護者が正確に記入したもの）
- 接種方法 生ワクチンを飲むことで免疫をつけます。なお、1回の接種だけでは十分な免疫がつかないため、2回飲むことが決められています。
- ※毎年4月と10月に実施していますので多少間があいても2回飲むようにしましょう。
- 受けられないお子さん
 - ・下痢をしている
 - ・37.5度を超える発熱がある
 - ・重篤な急性疾患にかかっている
 - ・免疫機能に異常があるか、免疫抑制をきたす治療を受けている
 - ・予防接種に含まれている成分でひどいアレルギーをおこしたことがある
 - ・その他、予防接種を受けることが不適当な状態にある
- ※風邪気味のお子さん、けいれんを起こした事のあるお子さんはかかりつけの医師にご相談ください。
- 接種上の注意
 - ・対象児には4月分と10月分の予防票を一度に送付します。10月開催時には通知を送付しませんので、広報おたわらをご覧ください。
 - ・会場にお越しください。
 - ・会場で体温測定をします。
 - ・接種を受けるかどうかの最終判断（サイン）を保護者に行ってください。

子育て支援情報

| | |
|---|--|
| 子育てサロン ★開設時間 9:00~12:00 | 赤ちゃんから就園前までのお子さんと保護者の交流の場です |
| 子育てサロンおおたわら (場所:大田原保健センター) | 開設日 月曜日 休館:3/22 |
| 子育てサロンのざき (場所:うすばアットホーム) | 開設日 水曜日 休館:3/31 |
| 子育てサロンゆづかみ (場所:湯津上農村環境改善センター) | 開設日 火・木曜日 休館:3/11、3/30 |
| 子育てサロンかわにし (場所:川西高齢者ほほえみセンター) | 開設日 月・水曜日 休館:3/22、3/29、3/31 |
| つどいの広場 ★開設時間 9:00~14:00 | 就園前のお子さんと保護者が交流を図りながら育児相談などを行うための場です |
| つどいの広場 県北体育館 (場所:県北体育館 幼児体育室) | 開設日 火・木・金・第2土曜日 休館:3/30 |
| つどいの広場 さくやま (場所:旧さくやま保育園) | 開設日 月・水・金・第4土曜日、3/20 休館:3/22、3/27、3/29、3/31 |
| 子育て支援センター ★開設時間 午前の部 9:00~12:00 午後の部 13:00~16:00 | 親子交流の場の提供や子育ての悩みに関する相談・適切なアドバイスを行います |
| すみよし子育て支援センター(場所:子育てプラザ館) | |
| くろばね子育て支援センター(場所:くろばね保育園) | |
| しんとみ子育て支援センター(場所:しんとみ保育園) | |
| 開設日 毎週 月~金曜日 休館:3/22 | |
| 【お願い】ケガや事故防止のため、お子さんから目を離さないようお願いします。 | |

●問い合わせ
こども課子育て支援係 TEL(23)8932

- ただきますので、必ず保護者が同伴してください。
- 他のワクチンとの間隔に注意して受けてください。
- 指定日に受けられない場合は、他の日でも受けられます。
- 接種後の注意
 - ・入浴は普段の様子と変わりなければ差し支えありません。
 - ・接種当日は激しい運動をさけてください。
 - ・ワクチンを飲んで30分以内に吐き出した場合は、すぐ申し出てください。
- 副反応について
 - ・極めてまれな頻度ですが、接種後にマヒを生ずる事があります。

●身体に異常が見られた時は、かかりつけの医師の診察を受け、母子健康係へご連絡ください。
- 予防接種を受けた人から接種後15〜37日間（平均26日間）にわたってポリオウイルスが便中に排泄されます。このウイルスがポリオウイルスに対する免疫をもっていない人や抗体価の低い人に感染してマヒを起こすことがあります。その頻度はとても低く、550万人に1人程度の割合です。
- 問い合わせ
こども課母子健康係
TEL(23)8634

