

	ワクチン名	種別	対象者と標準的な接種期間(「予防接種と子どもの健康」より抜粋)
定期 予防 接種	ヒブ感染症	不 活 化	初回接種: 生後2か月~7か月に至るまでの間にある者 ・接種間 1回目 → 2回目 → 3回目 → 追加 27日以上 27日以上 7~13か月
			初回接種: 生後7か月に至った日の翌日から12か月に至るまでの間にある者 ・接種間 1回目 → 2回目 → 追加 27日以上 7~13か月
	初回接種: 生後12か月に至った日の翌日から生後60か月に至るまでの間にある者 1回接種		
	初回接種: 生後2か月~7か月に至るまでの間にある者 ・接種間隔 27日以 27日以上 60日以上 追加接種(4回目)は生後12か月以降に接種してください。(標準的には12~15か月の間)		
	初回接種: 生後7か月に至った日の翌日から12か月に至るまでの間にある者 ・接種間隔 27日以上 60日以 追加接種(3回目)は生後12か月以降に接種してください。		
	初回接種: 生後12か月に至った日の翌日から生後24か月に至るまでの間にある者 ・接種間隔 1回目 → 2回目 60日以上		
B型肝炎	初回接種: 生後24か月に至った日の翌日から生後60か月に至るまでの間にある者 1回接種		
	【対象者】1歳に至るまでの間にある者 【標準的な接種期間】生後2か月に至った時から生後9か月に至るまでの期間 ・接種間隔 1回目 → 2回目 → 3回目 1回目から 27日以上あける 1回目から 139日以上あける		
法定外 接種防	ロタウイルス胃腸炎	生	【対象者】 ロタリックス: 生後6週の初日から24週の初日 ロタテック: 生後6週の初日から32週の初日 【接種回数】ロタリックス: 2回 ロタテック: 3回 ※ロタリックス・ロタテックともに、初回接種は生後14週6日までに始めるのが望ましい。
定期 予防 接種	DPT-IPV (ジフテリア・百日せき 破傷風・ポリオ)	不 活 化	【対象者】生後3か月~生後90か月に至るまでの間にある者 【標準的な接種期間】初回: 生後3か月~生後12か月に達する期間 追加: 初回3回終了後12か月~18か月に達するまでの期間 ・接種間隔 初回接種1回目 → 初回接種2回目 → 初回接種3回目 → 追加接種 20日以上 20日以上 6か月以上であれば可能だが12~18か月の間
			BCG 【対象者】生後12か月に至るまでの間にある者 1回接種 【標準的な接種期間】生後5か月に達したときから、生後8か月に達するまでの期間
	MR(麻しん・風しん) 【対象者】 <<1期>> 生後12か月から生後24か月に至るまでの間にある者 1回接種 <<2期>> 5歳以上7歳未満で、小学校就学前の1年間(年長児の4月1日~3月31日) 1回接種		
	水痘 (みずぼうそう) 【対象者】 生後12か月から生後36か月に至るまでの間にある者 2回接種 3か月以上であれば可能だがおおむね6か月~1年後 1回目 → 2回目		
法定外 接種防	おたふくかぜ	生	【対象者】1歳以上~未就学児(未罹患・未接種) 1回接種
定期 予防 接種	日本脳炎	不 活 化	【対象者】 <<1期>> 生後6か月から(標準的には3歳から)生後90か月に至るまでの間にある者 <<2期>> 9歳以上13歳未満の者 【標準的な接種期間】 <<1期>> 初回: 3歳 <<1期>> 追加: 4歳 <<2期>> 9歳~10歳 ・接種間隔 1回目 → 2回目 → 追加 → 2期 6日以上 6か月以上 おおむね5年
			D T (ジフテリア・破傷風) 【対象者】11歳以上13歳未満の者 【標準的な接種期間】小学6年生 1回接種
	ヒトパピローマウイルス 感染症 (子宮頸がん) ※積極的勧奨を差し控えています (2019.4.1現在) ・2価ワクチン(サーバリックス)の場合の接種間隔 1回目 → 2回目 → 3回目 1か月 初回接種から6か月後 ・4価ワクチン(ガーダシル)の場合の接種間隔 1回目 → 2回目 → 3回目 2か月 初回接種から6か月後		

※法定外予防接種は一部自己負担があります。