

|                | ワクチン名                                     | 種別  | 対象者と接種期間（「予防接種と子どもの健康」より抜粋）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定期<br>予防<br>接種 | ロタウイルス感染症                                 | 生   | <p>【対象者】 ロタリックス：生後6週の初日から24週の初日 <b>2回接種</b><br/> ロタテック：生後6週の初日から32週の初日 <b>3回接種</b><br/> ※初回接種は生後14週6日までに始めるのが望ましい。</p> <p>ロタリックスまたはロタテックのいずれかを選択。</p> <p>・ロタテック 1回目 → 2回目<br/>27日以上</p> <p>・ロタリックス 1回目 → 2回目 → 3回目<br/>27日以上 27日以上</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | 小児の肺炎球菌感染症                                | 不活化 | <p>【①初回接種が生後2か月から7か月に至るまでの間にある者】</p> <p>1回目 → 2回目 → 3回目 → 追加<br/>27日以上 27日以上 60日以上</p> <p>追加接種（4回目）は生後12か月以降に接種してください。（標準的には12～15か月に至るまで）</p> <p>※2回目、3回目接種は生後24か月を超えている場合は行わず、追加接種のみ60日以上間隔をおいて実施可能。<br/> ※2回目接種が生後12か月を超えている場合は3回目接種は行わず、追加接種のみ60日以上間隔をおいて実施可能。</p> <p>【②初回接種が生後7か月に至った日の翌日から12か月に至るまでの間にある者】</p> <p>1回目 → 2回目 → 追加<br/>27日以上 60日以上</p> <p>追加接種（3回目）は生後12か月以降に接種してください。</p> <p>※2回目接種が生後24か月を超えている場合は行わず、追加接種のみ実施可能。</p> <p>【③初回接種が生後12か月に至った日の翌日から生後24か月に至るまでの間にある者】 1回目 → 2回目<br/>60日以上</p> <p>【④初回接種が生後24か月に至った日の翌日から生後60か月に至るまでの間にある者】 1回接種</p> |
|                | B型肝炎                                      |     | <p>【対象者】 1歳に至るまでの間にある者</p> <p>【標準的な接種期間】 生後2か月に至った時から生後9か月に至るまでの期間</p> <p>1回目 → 2回目 → 3回目<br/>27日以上 1回目から139日以上あける</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | DPT-IPV-Hib<br>（ジフテリア・百日せき<br>破傷風・ポリオ・ヒブ） |     | <p>【対象者】 生後2か月～生後90か月に至るまでの間にある者</p> <p>【標準的な接種期間】 初回（1～3回目）：生後2か月から生後7か月に至るまでに開始<br/> 追加：初回3回終了後6～18か月おく</p> <p>1回目 → 2回目 → 3回目 → 追加<br/>20日以上 20日以上 6か月以上<br/> （標準的には20～56日） （標準的には20～56日） （標準的には6～18か月）</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | BCG                                       |     | <p>【対象者】 生後12か月に至るまでの間にある者 <b>1回接種</b></p> <p>【標準的な接種期間】 生後5か月に達したときから、生後8か月に達するまでの期間</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | MR（麻しん・風しん）                               |     | <p>【対象者】 ≪1期≫生後12か月から生後24か月に至るまでの間にある者 <b>1回接種</b><br/> ≪2期≫5歳以上7歳未満で、小学校就学前の1年間（年長児の4月1日～3月31日） <b>1回接種</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | 水痘<br>（みずぼうそう）                            | 生   | <p>【対象者】 生後12か月から生後36か月に至るまでの間にある者 <b>2回接種</b><br/> （すでに水痘にかかったことのあるお子さんは対象外）</p> <p>【標準的な接種期間】 生後12か月から生後15か月に達するまでの期間</p> <p>1回目 → 2回目<br/>3か月以上<br/> （標準的には6～12か月）</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 法定外<br>接種      | おたふくかぜ                                    |     | <p>【対象者】 1歳以上～未就学児（おたふくかぜにかかったことがなく、この予防接種をしたことがない方） <b>1回接種</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 定期<br>予防<br>接種 | 日本脳炎                                      |     | <p>【対象者】 ≪1期≫生後6か月（標準的には3歳）から生後90か月に至るまでの間にある者<br/> ≪2期≫9歳以上13歳未満の者</p> <p>【標準的な接種期間】 ≪1期≫初回（1・2回目）：3歳 <b>1回目 → 2回目 → 追加 → 2期</b><br/> ≪1期≫追加：4歳<br/> ≪2期≫9歳</p> <p>6日以上 6か月以上<br/> （標準的には6～28日） （標準的にはおおむね1年）</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | DT<br>（ジフテリア・破傷風）                         |     | <p>【対象者】 11歳以上13歳未満の者 <b>1回接種</b></p> <p>【標準的な接種期間】 小学6年生</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | ヒトパピローマウイルス感染症<br>（子宮頸がん）                 | 不活化 | <p>【対象者】 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までにある女性<br/> （小学6年生～高校1年生相当）</p> <p>【標準的な接種期間】 中学1年生</p> <p>2価ワクチン、4価ワクチンまたは9価ワクチンのいずれかを選択。<br/> 15歳未満の方が9価ワクチンを選択した場合は、2回で接種完了できる。</p> <p>・2価ワクチン（サーバリックス） 1回目 → 2回目 → 3回目<br/>1か月 1回目から6か月後</p> <p>・4価ワクチン（ガーダシル）<br/> 9価ワクチン（シルガード9） 1回目 → 2回目 → 3回目<br/>2か月 1回目から6か月後</p> <p>・9価ワクチン（シルガード9）<br/> ※15歳未満の方 1回目 → 2回目<br/>6か月 ※5か月未満である場合は3回接種が必要</p> <p>※当該方法を取れない場合は、1か月以上間隔をおいて2回目接種。3回目は1回目の注射から5か月以上、かつ2回目の注射から2か月半以上あける。</p> <p>※当該方法を取れない場合は、1か月以上間隔をおいて2回目接種。3回目は2回目の注射から3か月以上あける。</p>                          |

※法定外予防接種は一部自己負担があります。