

	ワクチン名	種別	対象者と接種期間（「予防接種と子どもの健康」より抜粋）
定期 予防 接種	ロタウイルス感染症	生	<p>【対象者】 ロタリックス：生後6週の初日から24週の初日 2回接種 ロタテック：生後6週の初日から32週の初日 3回接種 ※初回接種は生後14週6日までに始めるのが望ましい。</p> <p>・ロタリックス 1回目 → 2回目 27日以上</p> <p>・ロタテック 1回目 → 2回目 → 3回目 27日以上 27日以上</p> <p>ロタリックスまたはロタテックのいずれかを選択。</p>
	小児の肺炎球菌感染症	不活化	<p>【①初回接種が生後2か月から7か月に至るまでの間にある者】</p> <p>1回目 → 2回目 → 3回目 → 追加 27日以上 27日以上 60日以上</p> <p>追加接種（4回目）は生後12か月以降に接種してください。（標準的には12～15か月に至るまで）</p> <p>※2回目、3回目接種は生後24か月を超えている場合は行わず、追加接種のみ60日以上間隔をおいて実施可能。 ※2回目接種が生後12か月を超えている場合は3回目接種は行わず、追加接種のみ60日以上間隔をおいて実施可能。</p> <p>【②初回接種が生後7か月に至った日の翌日から12か月に至るまでの間にある者】</p> <p>1回目 → 2回目 → 追加 27日以上 60日以上</p> <p>追加接種（3回目）は生後12か月以降に接種してください。</p> <p>※2回目接種が生後24か月を超えている場合は行わず、追加接種のみ実施可能。</p> <p>【③初回接種が生後12か月に至った日の翌日から生後24か月に至るまでの間にある者】 1回目 → 2回目 60日以上</p> <p>【④初回接種が生後24か月に至った日の翌日から生後60か月に至るまでの間にある者】 1回接種</p>
	B型肝炎	不活化	<p>【対象者】 1歳に至るまでの間にある者 1回目 → 2回目 → 3回目 【標準的な接種期間】 生後2か月に至った時から生後9か月に至るまでの期間 27日以上 1回目から139日以上あける</p>
	DPT-IPV-Hib （ジフテリア・百日せき 破傷風・ポリオ・ヒブ）	不活化	<p>【対象者】 生後2か月～生後9か月に至るまでの間にある者 【標準的な接種期間】 初回（1～3回目）：生後2か月から生後7か月に至るまでに開始 追加：初回3回終了後6～18か月おく</p> <p>1回目 → 2回目 → 3回目 → 追加 20日以上 20日以上 6か月以上 （標準的には20～56日） （標準的には20～56日） （標準的には6～18か月）</p>
	BCG	生	<p>【対象者】 生後12か月に至るまでの間にある者 1回接種 【標準的な接種期間】 生後5か月に達したときから、生後8か月に達するまでの期間</p>
	MR（麻しん・風しん）	生	<p>【対象者】 <<1期>>生後12か月から生後24か月に至るまでの間にある者 1回接種 <<2期>>5歳以上7歳未満で、小学校就学前の1年間（年長児の4月1日～3月31日） 1回接種</p>
	水痘 （みずぼうそう）	生	<p>【対象者】 生後12か月から生後36か月に至るまでの間にある者 2回接種 （すでに水痘にかかったことのあるおひさまは対象外） 【標準的な接種期間】 生後12か月から生後15か月に達するまでの期間</p> <p>1回目 → 2回目 3か月以上 （標準的には6～12か月）</p>
法定外 接種	おたふくかぜ	不活化	<p>【対象者】 1歳以上～未就学児（おたふくかぜにかかったことがなく、この予防接種をしたことがない方） 1回接種</p>
定期 予防 接種	日本脳炎	不活化	<p>【対象者】 <<1期>>生後6か月（標準的には3歳）から生後90か月に至るまでの間にある者 <<2期>>9歳以上13歳未満の者 【標準的な接種期間】 <<1期>>初回（1・2回目）：3歳 1回目 → 2回目 → 追加 → → → 2期 <<1期>>追加：4歳 6日以上 6か月以上 <<2期>>9歳 （標準的には6～28日） （標準的にはおおむね1年）</p>
	DT （ジフテリア・破傷風）	不活化	<p>【対象者】 11歳以上13歳未満の者 1回接種 【標準的な接種期間】 小学6年生</p>
	ヒトパピローマウイルス感染症 （子宮頸がん）	不活化	<p>【対象者】 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までにある女性 （小学6年生～高校1年生相当） 【標準的な接種期間】 中学1年生</p> <p>9価ワクチンを使用する。 15歳未満の方は、接種方法によっては2回で接種完了できる。</p> <p>9価ワクチン（シルガード9） 1回目 → 2回目 → 3回目 2か月 1回目から6か月後（2回目から3か月以上あいていること）</p> <p>※当該方法を取れない場合は、1回目から1か月以上間隔をおいて2回目接種。3回目は2回目の注射から3か月以上あける。</p> <p>9価ワクチン（シルガード9） 1回目 → 2回目 6か月 ※5か月未満である場合は3回接種が必要 1回目を14歳の誕生日前日までに接種し、5か月（標準的には6か月）の間隔をあけて2回目を接種する。</p>

※法定外予防接種は一部自己負担があります。